

# Unahitaji Kufahamu Nini Kuhusu Dawa Zako za Kifua Kikuu (TB):

## Rifampin (RIF) Oral

### Kuhusu Dawa Yako:

RIFAMPIN (rif-AM-pin) ni kiua vijasumu kinachotumika kutibu kifua kikuu (TB), kwa kawaida, kwa kujumuisha pamoja na dawa nyingine moja au zaidi za kifua kikuu. Rifampin inaweza pia kutumika kutibu maambukizi.

### Kabla ya Kutumia Dawa Hii:

Mweleze daktari, muuguzi na mfamasia wako iwapo:

- Una mizio na dawa
- Una ujauzito au unapanga kuwa mjamzito
- Unanyonyesha
- Unatumia dawa zingine zozote
- Unatumia dawa za kununua madukani (kama vile dawa za mafua, dawa za kupunguza maumivu, vitamin, miti shamba n.k)
- Una matatizo yoyote ya kitabibu ikiwemo kisukari, jongo, ugonjwa wa ini, au ugonjwa wa figo.

### Dondoo za kukusaidia Kutumia Dawa Zako:

- Tumia kama ilivyoelekezwa.
- Tumia na maji yaliyojaa kwenye bilauli tumbo likiwa halina kitu (saa 1 kabla au saa 2 baada ya kula).
- Usipitishe dozi au kutumia zaidi ya dozi moja kwa wakati.
- Usishirikiane dawa zako na wengine.
- Weka dawa hizi na zingine zote mbali na watoto.
- Hifadhi dawa mahali penye tulivu, pakavu na weka mbali na joto au baridi kali.

[www.scdhec.gov/tb](http://www.scdhec.gov/tb)



### Onyo:

- USITUMIE kilevi wakati unapokuwa kwenye matibabu haya ili kuepuka uwezekano wa matatizo ya ini.
- Iwapo unafikiri umezidisha dozi ya dawa hizi, piga simu kwa wadhibiti wa sumu kwa namba 1-800-222-1222.

### Madhara ya Kando ya Dawa za Kifua Kikuu yanayoweza kutokea:

- Tumbo kuchafuka au maumivu ya tumbo
- Kichefuchefu au kutapika
- Udhaiyu mkali au kuchoka sana
- Dalili za mafua
- Mkojo wenye rangi ya kahawa/ chai au choo kikubwa kilaini
- Macho ya njano au ngozi
- Vipele au kuwashwa
- Kutokwa na damu kirahisi au michubuko
- Uoni hafifu
- Maumivu au kusisimkwa kwenye mikono, miguu na viungo
- Kizunguzungu
- Homa

### RIF may also:

- Kuingiliana na dawa za uzazi wa mpango/matibabu ya kupandikiza mbegu na methadoni
- Kusababisha mkojo, jasho au machozi kubadilika rangi na kuwa rangi ya chungwa
- Uharibufu wa lensi laini za kuona
- Kusababisha kuadhdhiriwa haraka na juu.



Wasiliana na muuguzi wako wa DHEC haraka iwapo utapitia madhara yoyote ya kando katika haya.